

Re población

Se refiere al reemplazo de una parvada completa, no solo agregando individuos a una parvada existente, usualmente con pollitos jóvenes.

- Si está agregando a una parvada establecida, ponga en aislamiento o cuarentena nuevas aves por al menos 30 días como es recomendado en folleto “Aislamiento y Cuarentena” para prevenir la propagación de la enfermedad.

Periodo de descanso

Se refiere a un “periodo sin aves” entre parvadas para dar tiempo para que los virus y bacterias en el ambiente mueran.

Cuando utilizar este periodo de descanso:

- Es necesario cada vez que una parvada es reemplazada para reducir el riesgo de pasar enfermedad entre grupos de aves.
- Esto es especialmente importante después de un **brote de enfermedad***
- Antes de repoblación, una limpieza completa debe ocurrir y las jaulas deben estar vacías por un periodo de tiempo. Una limpieza completa involucra vaciar, limpiar, y desinfectar las instalaciones.
- El tiempo entre grupos de aves es usado para limpiar el gallinero y permitir que los agentes que causan enfermedades mueran.

*Para más información, por favor vea el folleto “Limpieza y Desinfección”

Procedimiento General

Paso 1: “Todo Afuera”

- Usar equipo de Protección Personal Apropriada (PPA), **retirar** todas las aves de la instalación (“despoblar”).

Paso 2: Retirar toda la Materia Fecal

- Retirar comida vieja, heces, camada, plumas, etc. de la instalación.
- También retire 3-4 pulgadas de tierra desde el suelo.

Paso 3: Limpiar y Desinfectar

- Limpiar y desinfectar (L&D) la instalación completamente siguiendo el protocolo de el folleto “*Limpieza y Desinfección*”:
- Toda superficie del interior
- Equipo de alimentación
- Bebederos y líneas de agua
- Maquinaria del interior (ventiladores, calentadores, etc.)

Paso 4: Controle plagas

- Esto puede requerir ayuda profesional.
- Plagas incluyen insectos (p. ej. piojos, ácaros, garrapatas, pulgas), roedores, otros pájaros.



UC Davis School of Veterinary Medicine: MOSAIC

Paso 5: Pruebas/ Inspección


- Haga que su instalación sea probada e inspeccionada para su limpieza.

Paso 6: Periodo de descanso

- Deje instalación vacía por 2-3 semanas antes de repoblar con nuevas aves¹.

Para más información, llame la Línea Directa de Aves Enfermas al (866) 922-2473 o visite:

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Avian_Health_Program.html



Re poblacion: Guias y Puntos Importantes

Adquiriendo Nuevas Aves (“Todo Adentro”)

- Asegure que nuevas aves son compradas de criadores de pollos de renombre y sin enfermedades.
- Busque criadores que son certificados por NPIP².
 - Visite poultryimprovement.org para más información.
- Compre aves de la misma edad y de la misma fuente³.

Densidad y re-poblacion

- Asigne 2.5-3.5 pies cuadrados por aves adentro de un gallinero y 4-5 pies por ave de espacio cercado al aire libre⁴.
- Algunas razas pueden requerir más o menos espacio dependiendo en características sociales.
- En caso de un brote de enfermedad que requiera eutanasia de una parvada entera, es crítico que repuebla su parvada cuidadosamente y en un horario apropiado.
 - Enfermedades que requieren despoblación de una parvada incluyen Enfermedad de Newcastle, Influenza Aviar, y algunas especies de Salmonella.
 - Cuando enfrentando un brote de enfermedad, asegúrese de notificar sus autoridades locales de salud (<https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/>)
- Siga el **procedimiento de descanso** descrito previamente antes de comprar nuevas aves.
- Durante re-población, identifique fuentes potenciales de transmisión de enfermedades y elimínelas. Estas pueden incluir:
 - Gatos salvajes y mascotas
 - Aves acuáticas en la propiedad
 - Pasto alto/ desalineado donde roedores pueden esconderse
 - Proximidad cercana a otra propiedad que tenga animales, incluyendo otras parvadas de gallinas
- Use ropa y zapatos designados cuando trabaje con su parvada.
- Lave sus manos después de trabajar con sus aves.

Referencias y Recursos:

1. Capítulo 5: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/130718/10/10_chapter5.pdf
2. https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/pdfs/TopTipsforKeepingYourBackyardBirdsHealthy.pdf
3. https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/BioSpecies/BioPoultry.html
4. <http://warren.cce.cornell.edu/4-h/backyard-chickens>

Para más información, llame la Línea Directa de Aves Enfermas al (866) 922-2473 o visite:

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Avian_Health_Program.html