

Virus de la Enfermedad de Newcastle

Recomendaciones de Vacunación

Una Guia Rápida para Dueños de Aves de Corral

** Información Importante **

- La vacunación ayuda a prevenir la enfermedad pero **NO** cura ni es un tratamiento contra la enfermedad.
- Si sus aves parecen estar enfermas, no las vacune.
- La vacunación puede dificultar la detección de animales infectados durante el brote de la enfermedad porque puede parecer que están sanos cuando no lo están.

¿Por qué debería de Vacunar?

- Las vacunas protegen a los animales de enfermedades y reducen los signos clínicos de la enfermedad si los animales son expuestos al virus.
- La vacunación ayuda a reducir la propagación de la enfermedad entre los animales y hacia el ambiente.

¿Cómo debo aplicar la vacuna?


La forma en la que debe de vacunar, dependerá del tipo de vacuna que tenga:



Vacunas de virus vivo (botellas con 1,000-dosis):

Para vacunar usando gotas en los ojos:

1. Remueva el sello y el tapón de hule de la vacuna y llene el frasco a la mitad con el diluyente.
2. Vuelva a poner el tapón de hule y agite el frasco gentilmente.
3. Vacíe el contenido de la vacuna en el frasco del diluyente. Tape con el tapón de hule y agite el frasco gentilmente.
4. Remueva el tapón de hule y ponga el tapón gotero dosificador en el frasco del diluyente. Mantenga la vacuna fría después de mezclarse.
5. Para vacunar: Aplique una gota de la vacuna en un ojo.



Vacunas de virus muerto:

Para inyección en la pechuga:

1. Sujete a las aves de las alas para exponer los músculos de la pechuga.
2. Inyecte a las aves en la parte más gruesa de la pechuga (usualmente la parte superior). **Inyecte una dosis = 0.5 ml**
3. Deseche las agujas y el sobrante de la vacuna apropiadamente (i.e. hierva la botella de vacuna y agujas antes de eliminar).

Calendario de vacunación recomendado

Primera dosis → 1-2 semanas de vida (virus vivo)

Segunda dosis → 4 semanas de vida (virus vivo)

Tercer dosis → 10 semanas de vida (virus muerto)

Después cada 6 meses durante el brote de la enfermedad.

Después del brote, la vacunación puede ser anual con virus muerto, eso les dará suficiente protección.

¿Tiene preguntas? Para más información...

visite **UC Cooperative Extension** página web de aves de corral <https://ucanr.edu/sites/poultry/>

o

Siganos en UC Davis School of Veterinary Medicine en Facebook (UCDavisVetMed) y Twitter (@ucdavisvetmed)