


Trips



Trips occidental de las flores, *Frankliniella occidentalis*

- Aproximadamente 1 mm (1/25 pulgada) de largo
- Forma alargada tubular
- Adultos con alas con flecos
- La parte anterior de la cabeza es cuadrada, con un par de ojos rojos en las esquinas y un par de antenas cortas en el centro



Trips de la vid, *Drepanothrips reuteri*

- De apariencia similar al trips occidental de las flores



Daño temprano en los brotes

- Temprano en la primavera cuando los brotes miden menos de 30 cm de largo
- Entre nudos cortos
- Crecimiento retardado



Daño: que se observa en la mitad de la temporada

- Hojas basales deformes causadas por los trips al alimentarse en hojas



Foto: Lucia Varela

Izquierda: Brote normal


Derecha: Daño observado más tarde en la temporada causado por trips al alimentarse temprano en la primavera

- Cicatrices en el brote y entre nudos cortos



Depredador: Ninfa de la chinche pirata diminuta

- Las ninfas son ovaladas de color crema con una mancha naranja en el abdomen
- Boca chupadora larga
- Como implica su nombre, son pequeñas pero más grandes que los trips



Depredador: Adulto de la chinche pirata diminuta, *Orius tristicolor*

- Los adultos tienen alas blancas y negras

Trips

Fecha	Estado del insecto	Que debe buscar
Desde brotación hasta final de abril	Adultos y jóvenes	<ul style="list-style-type: none">• Retraso en el crecimiento del brote inmediatamente después de la brotación• Después de la brotación busque daño o bronceado en el borde de hojas pequeñas en la punta del brote. Separe estas pequeñas hojas y busque trips con una lupa.• El daño causado por trips puede ser más evidente si el crecimiento del brote se retrasa debido a clima frío.• Cuando los brotes son cortos, busque trips en las hojas en desarrollo en la punta del brote.• Cuando los brotes pueden ser doblados sin ser dañados, golpee suavemente la punta del brote sobre una superficie plana blanca. Cuente insectos alargados que se mueven rápidamente.