Consideraciones para el manjeo de la enfermedad de 'Red Blotch' en viñedos

A

Pocas plantas infectadas distribuidas por el bloque entero



B

Muchas plantas infectadas, concentradas en ciertas zonas del bloque, típicamente cerca de las orillas

1ª FASE



2ª FASE



3ª FASE



4ª FASE



		➡ 1ª Fase	➡ 2ª Fase	➡ 3ª Fase	➡ 4ª Fase
Frecuencia de plantas sintomáticas	**≤ 1%**	**1-4%**	**4-16%**	**16-50%**	**>50%**
Nivel de agregación de plantas sintomáticas	**0%**	Baja **10-60%**	Intermedia **35-85%**	Alta **70-90%**	Alta **90-100%**
Manejo de la enfermedad	Sacar plantas infectadas una por una	Sacar todas las plantas en la zona agrupada y dentro de 30 pies del borde de la agrupación. Afuera de la agrupación, sacar plantas infectadas una por una. Siempre con la consideración del nivel de enfermedad en bloques vecindarios.		Sacar y renovar el bloque entero. Siempre con la consideración del nivel de enfermedad en bloques vecindarios.	

UC CE

Esta guía tiene como objetivo apoyar la toma de decisiones sobre la enfermedad de la mancha roja de la vid. Hemos sintetizado información de estudios ecológicos de GRBD realizados en 12 sitios de campo en el Valle de Napa entre 2021 y 2024. La investigación está en curso y las experiencias individuales pueden diferir de los escenarios presentados aquí. La UCCE no se responsabiliza de los resultados de determinadas decisiones agrícolas.

S. MacDonald, H. Fendell-Hummel, M. Cooper, Programa de Viticultura de la UCCE-Napa, julio de 2025